

- Glandulina annulata*, Stache, 1864, Novara-Exped., geol. Theil, vol. i., Paläont., p. 184, pl. xxii. fig. 6.
 „ *subovata*, Id. Ibid. p. 185, pl. xxii. fig. 7.
 „ *napæformis*, Id. Ibid. p. 186, pl. xxii. fig. 8.
 „ *symmetrica*, Id. Ibid. p. 187, pl. xxii. fig. 9.
Nodosaria (Gl.) lœvigate, Parker and Jones, 1865, Phil. Trans., vol. clv. p. 340, pl. xiii. fig. 1.
Glandulina gracilis, Reuss, 1865, Denkschr. d. k. Akad. Wiss. Wien, vol. xxv. p. 137, pl. ii. figs. 25–27.
 „ *lœvigate*, var. *inflata*, Id. Ibid. p. 136, pl. ii. figs. 29–31.
 „ *cuneiformis*, Terquem, 1866, Foram. du Lias, 6^{ème} Mém., p. 478, pl. xix. fig. 7.
 „ *obconica*, Reuss, 1868, Sitzungsb. d. k. Ak. Wiss. Wien, vol. lvii. p. 104, pl. i. fig. 7.
 „ *turbiniformis*, Terquem, 1870, Foram. du Syst. Oolith., 3^{ème} Mém., p. 240, pl. xxv. fig. 9.

a. Asymmetrical tapering specimens, with more or less oblique sutures.

- Glandulina elongata*, Costa, 1856, Atti dell' Accad. Pontan., vol. vii. p. 128, pl. xi. fig. 23.
 „ *adunca*, Id. Ibid. p. 128, pl. xi. fig. 24.
Psecadium simplex, Neugeboren, 1856, Denkschr. d. k. Akad. Wiss. Wien, vol. xii. p. 99, pl. v. fig. 13.
 „ *elongatum*, Reuss, 1858, Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesell., vol. x. p. 437, No. 1.
 „ *subovatum*, Karrer, 1864, Sitzungsb. d. k. Ak. Wiss. Wien, vol. i. p. 707, pl. i. fig. 7.

Atractolina, sp., Schlicht, 1870, Foram. Pietzpuhl, p. 69, pl. xxv. figs. 1–10.

Psecadium acuminatum, Reuss, 1870, Sitzungsb. d. k. Ak. Wiss. Wien, vol. lxii. p. 470, No. 1.

B. Oval variety with rounded base.

Nodosaria (Gl.) rotundata, Reuss, Pl. LXI. figs. 17–19.

- Glandulina rotundata*, Reuss, 1849, Denkschr. d. k. Akad. Wiss. Wien, vol. i. p. 366, pl. xlvi. fig. 2.
 „ *ovalis*, Alth, 1850, Haidinger's Naturw. Abhandl., vol. iii. p. 270, pl. xiii. fig. 31.
 „ *concinna*, Reuss, 1855, Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch., vol. vii. p. 263, pl. viii. fig. 1.
 „ *obtusa*, Costa, 1856, Atti dell' Accad. Pontan., vol. vii. p. 126, pl. xi. fig. 20.
 „ *punctata*, Egger, 1857, Neues Jahrb. für Min. &c., p. 305, pl. xv. figs. 32, 33.
 „ *obtusissima*, Reuss, 1863, Sitzungsb. d. k. Ak. Wiss. Wien, vol. xlvi. p. 66, pl. viii. figs. 92, 93.

Nodosaria radicula (pars), Parker and Jones, 1865, Phil. Trans., vol. clv. p. 341, pl. xiii. figs. 2, 3, &c.
Glandulina pygmaea, Terquem, 1866, Foram. du Lias, 6^{ème} mém., p. 478, pl. xix. fig. 6.

- „ *oviformis*, Terquem, 1878, Mém. Soc. géol. France, sér. 3, vol. i. Mém. III., p. 12, pl. i. figs. 1, 2.
 „ *nummularia*, Gümbel, 1868, Abhandl. d. k. bayer. Ak. Wiss., II. Cl., vol. x. p. 628, pl. i. fig. 50.
 „ *undulata*, Karrer, 1868, Sitzungsb. d. k. Ak. Wiss. Wien, vol. lviii. p. 165, pl. iv. fig. 2.
 „ *parallela*, Marsson, 1878, Mittheil. naturw. Vereine v. Neu-Vorpom. u. Rügen., Jahrg. x. p. 124, pl. i. fig. 4.

b. Asymmetrical specimens with rounded base, and more or less oblique sutures.

- Psecadium ellipticum*, Neugeboren, 1856, Denkschr. d. k. Akad. Wiss. Wien, vol. xii. p. 99, pl. v. fig. 14.
 „ *ovatum*, Seguenza, 1880, Atti R. Accad. dei Lincei, sér. 3, vol. vi. p. 139, pl. xiii. fig. 8.