Zoology Part LVII: Report on the DEEP-SEA FISHES. By Dr. Albert Günther. Bound in Volume 22,1887.

Vertical Range of Distribution

	0–100	100–300	300–500	500–700	700–1000	
Phycis chesteri,	.	—	. .	. .	. . .	170
Phycis regius,	—	—	. .	. .	. . .	71
Phycis americanus,	—	—	. .	. .	. . .	72
Phycis tenuis,	—	—	. .	. .	. . .	73
Læmonema barbatulum,	.	—	—	. .	. . .	74
Haloporphyrus guentheri,	.	- - -	- - -	. .	. . .	75
Haloporphyrus lepidion,	.	- - -	- - -	. .	. . .	76
Haloporphyrus eques,	.	. .	—	—	. . .	77
Haloporphyrus inosimæ,	.	. .	—	. .	. . .	78
Haloporphyrus ensiferus,	.	. .	. .	—	. . .	79
Antimora rostrata,	.	. .	. .	—	— — —	80
Antimora viola,	.	. .	— —	— —	— — —	81
Molva molva,	—	—	. .	. .	. . .	82
Molva abyssorum,	.	— —	. .	. .	. . .	83
Onus macrophthalmus,	—	. .	. .	. .	. . .	84
Onus carpenteri,	.	—	. .	. .	. . .	85
Onus reinhardti,	—	— —	— —	— —	. . .	86
Onus septentrionalis,	—	—	. .	. .	. . .	87
Onus ensis,	—	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	88
Onus cimbrius,	—	— —	. .	. .	. . .	89
Brosmius brosme,	—	— —	— —	—	. . .	90
Chiasmodus niger,	.	. .	— —	— —	— — —	91
Ophidiidæ—						
Barathrodemus manatinus,	.	. .	. .	—	. . .	92
Neobythites grandis,	.	. .	. .	. .	. . .	93
Neobythites macrops,	.	. .	—	. .	. . .	94
Neobythites ocellatus,	.	. .	—	. .	. . .	95
Neobythites gillii,	.	—	. .	. .	. . .	96
Catæstyx messieri,	.	. .	—	. .	. . .	97
Pteridium atrum,	.	- - -	. .	. .	. . .	98
Pteroidonus quinquarius,	.	. .	. .	—	. . .	99
Dicrolene intronigra,	.	. .	—	— —	. . .	200
Mixonus laticeps,	.	. .	. .	. .	. . .	1

http://19thcenturyscience.org/HMSC/HMSC-Reports/Zool-57/README.htm